

ヘルニアの手術(腹腔鏡下ヘルニア根治術)を受けられる ( )様

	入院時 ( / )	手術当日 ( / )		術後1日目 ( / )	2日目 ( / )	3日目 ( / )	4日目 ( / )	5日目 ( / )	6日目 ( / )	7日目 ( / )
治療・処置	手術する部位の毛を剃る場合があります おへその掃除をします 	手術前 弾カストッキングを手術翌日まで着用します 	手術後 手術後は部屋を観察室に移動します 手術後 <b>3時間</b> は酸素やモニターを使用します 手術後 <b>3時間</b> はフットポンプを使用します 手術後に傷の消毒をする場合があります 手術中におしこの管が入る場合がありますが動けるようになると抜けます   	退院できます  傷を消毒します 						抜糸します 
検査				採血があります 						
薬	医師の指示で下剤を飲む場合があります 寝る前に眠剤を飲む場合があります   	手術前に点滴を始めます 手術前に浣腸します 	24時間点滴をします 手術直前と手術後に抗生物質の点滴があります 	点滴をします 抗生物質の点滴が朝と夕にあります 	必要時内服に変更になります 					
食事	食べ物は <b>21時</b> までとし 飲み物についてはこちらからお知らせします。		手術 <b>3時間</b> 後より、 眼が覚めていたら水分が飲めます 	朝食より食べられます(普通食) 						
清潔	お風呂に入りましょう 必ず爪切りやひげ剃りを行い、 マニキュアなどは落としておいてください  			清拭します 	シャワーできます 					
安静度			手術後 <b>3時間</b> で トイレに行けます 	安静の制限はありません						
説明	手術の必要物品  オリエンテーション	薬剤指導 弾カストッキング着用指導	手術終了までご家族のうち一人は必ず患者食堂でお待ち下さい 	退院指導予定 手術で縫ったところは、皮膚の弾力性が弱くなっていますので、無理な力がかからないように注意しましょう  体調が悪い時や気がかりなことがある時には、すぐに外来受診をして下さい						